

๓ กักหมา กักสัตว์ที่ก่อไว้ดูอาการอย่างน้อย ๑๕ วัน เว้นแต่สัตว์นั้นดูร้าย กัดคนหรือสัตว์อื่น ถ้าไม่สามารถกักสัตว์นั้นไว้ได้ให้ทำลาย หรือถ้าสัตว์นั้นหายไ้ไปถือว่าสัตว์นั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

๔ หามหมอ พบแพทย์ หรือสัตวแพทย์ทันที เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและซีรัม อย่างไรก็ตามสัตว์ที่กัดตายเมื่อสัตว์ตายให้รีบตัดหัวสัตว์ส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทันที

หน้าที่ของเจ้าของสุนัขตาม

พรบ. โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕

๑ นำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัข อายุได้ ๒-๔ เดือน และครั้งต่อไปตามที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๒ เมื่อสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้ติดเครื่องหมายประจำตัว และเก็บใบรับรองการฉีดวัคซีนไว้ การขายหรือให้สุนัขแก่ผู้อื่นต้องมอบใบรับรองให้ด้วย

๓ โดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่มีเครื่องหมายประจำ และถูกเจ้าหน้าที่จับขัง ๕ วัน ถ้าไม่มีผู้ไปปรับจะถูกทำลาย ไม่ปล่อยสัตว์ออกมาในสาธารณะ

๔ เมื่อสัตว์มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้แจ้งต่อสัตวแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน ๒๔ ชั่วโมง

บทลงโทษตามพระราชบัญญัติ

โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕

๑ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่นำสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

๒ ผู้ใดมีเครื่องหมายแสดงว่าการฉีดวัคซีนปลอมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๓ ผู้ใดขัดขวาง หรือไม่อำนวยความสะดวกในการจับสุนัขไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ หรือทำลายสุนัขที่เป็นโรคนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ท่านกำลังทำผิดต่อสังคมอย่างไรอยู่หลวถ้าท่าน

๑ ปล่อยสุนัขของท่านพ่นพ่วนในที่สาธารณะโดยไม่ดูแล แล้วสุนัขไปก่อความเดือดร้อน รำคาญเสียหายแก่ผู้อื่น

๒ ปกปิดเมื่อสุนัขที่เลี้ยงไปกัดกับสุนัขที่บ้าแล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพราะสุนัขนั้นอาจติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก่ออันตรายในภายหลัง

๓ นำสุนัขไปปล่อยตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน เป็นการผลักรถไฟผู้อื่น

จะส่งซากสัตว์วินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไร

๑ ตัดหัวสัตว์ตรงคอใส่ถุงพลาสติกซ้อนหลายๆชั้น ใส่ถุงมือทกรังที่ตัดหัวสัตว์

๒ ใส่กระติกและใส่น้ำแข็งให้เย็นตลอดเวลา

๓ ส่งพร้อมประวัติสัตว์ ชนิด เพศ อายุ

สี อาการป่วย ชื่อ ที่อยู่ เจ้าของสัตว์ และผู้ที่ถูกกัด

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



ด้วยความปรารถนาดี
จาก อปต.ไทยเจริญ

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า ชาวบ้านมักเรียกว่า “โรคกลัวน้ำ” หรือ “โรคหมาว้อ” เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น สุนัข แมว ชะนี ลิง กระรอก ค้างคาว หู แม่น้ำเต่า วัว ควาย แพะ ซึ่งโรคนี้หากเกิดอาการแล้วจะเสียชีวิตทุกราย

การติดต่อ

สัตว์ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจะแพร่เชื้อทางน้ำลาย คนหรือสัตว์จะติดเชื้อเมื่อกินสัตว์ที่เป็นโรคกัด หรือข่วน หรือน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคสัมผัสกับบาดแผล เยื่อตา จมูก ปาก โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมวจะพบว่า มี

เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าออกมากับน้ำลายตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ ๑-๗ วัน

อาการที่พบในคน

ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรคจะแสดงอาการหลังรับเชื้อประมาณ ๓ สัปดาห์ - ๖ เดือน แต่บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมากไม่ถึง สัปดาห์ หรืออาจนานเกิน ๑ ปี อาการเริ่มแรก คือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัดแล้วลามไปส่วนอื่น กระสับ กระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพื่อ เจ็บ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว

กลัมน้ำ ปวดท้องน้อย และกล้ามเนื้อขากระดูก แขน หน้าอก หายใจไม่ออก หรืออาเจียนเกร็ง อัมพาตหมดสติ และตายในที่สุด

อาการในสุนัข

ระยะฟักตัวของโรคจะอยู่ในช่วง ๓-๘ สัปดาห์ ไม่เกิน ๖ เดือน และจะตายภายใน ๑๐ วัน หลังจากแสดงอาการ ซึ่งมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะคือ

❖ ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

❖ ระยะตื่นต้น

สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวน กระวายตื่นต้น หงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก มานต่ายขยายกว้าง

❖ ระยะอัมพาต

สุนัขมีอาการทางอัมพาต ลิ้นสีแดง คล้าห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล ขย่อนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี่ยนทรงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว และตายในที่สุด

การป้องกัน

- ❖ ต้องนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
- ❖ ให้สุนัขอยู่ในสายจูงเมื่อนำออกมา
- ❖ ทำหมันหรือฉีดยาคุมเพื่อควบคุมจำนวนไม่ให้มากเกินไป

❖ ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดด้วยคาถา ๕ ย.

❖ เมื่อถูกสุนัขกัดต้องรีบล้างแผล

ใส่ยา กักหมา (๑๐ วัน) ทาหมอม ฉีควัคซีนต่อจนครบชุด

คาถา ๕ ย กันสุนัขกัด

ย ๑ : อย่าแหย่ (สุนัขให้ไม้โท)

ย ๒ : อย่าเหยียบ (หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขตกใจ)

ย ๓ : อย่าแยก (สุนัขที่กำลังกัดด้วยมือเปล่า)

ย ๔ : อย่าหยิบ (จานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะสุนัขกำลังกินอาหาร)

ย ๕ : อย่ายุ่ง (หรือเข้าไปใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ)

เมื่อถูกสุนัข หรือแมวกัด ข่วน ต้องทำดังนี้

❶ ล้างแผล เมื่อสัตว์กัดหรือข่วนจนเป็นแผล ต้องล้างแผลทันทีให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งให้ถึงกับแผล เพื่อให้เชื้อออกจากบาดแผลให้มากที่สุด ล้างสบู่อกให้หมด เช็ดแผลให้แห้ง

❷ ใส่ยา ใส่ยาฆ่าเชื้อแผลสด เช่น

ทิงเจอร์เบตาดีน หรือ แอลกอฮอล์ จะช่วยฆ่าเชื้อโรค และอย่าใส่สิ่งอื่น เช่น เกลือ ยาฉุน ลงในแผลเป็นอันตราย